

LA SÍFILIS

Si usted está viviendo con el VIH, usted puede proteger su salud al evitar otras enfermedades infecciosas, incluida la sífilis.

¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una enfermedad que generalmente se transmite por contacto sexual o contacto piel a piel con las áreas infectadas del cuerpo. Durante el embarazo, es posible que una mujer transmita la sífilis a su hijo al nacer.

Aunque las tasas de sífilis en los Estados Unidos son bajas, en Los Ángeles va en aumento y se puede contraer sífilis. La mejor manera de evitar la sífilis es protegiéndote, sobre todo cuando tienes relaciones sexuales con alguien que pueda estar infectado.

Su médico o clínica puede hacerle la prueba de infección por sífilis con un análisis de sangre.

¿Cuáles son los síntomas de la sífilis?

Muchas personas infectadas con sífilis no tienen ningún síntoma durante años, pero aún hay riesgo de efectos secundarios graves si no se tratan. La sífilis es una enfermedad infecciosa que tiene diferentes etapas. Cada etapa de la sífilis causa diferentes síntomas que van y vienen, pero nunca debe ser ignorado.

Las etapas iniciales de la sífilis son la sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis latente.

La Sífilis Primaria: aparece 10 días a 3 meses después de la infección. Durante esta etapa, una llaga sin dolor llamada chancro (o múltiples chancros) aparece en, alrededor o dentro del pene, la vagina, la boca o el ano. Los chancros por general duran de 2 a 6 semanas y luego desaparecen por sí solos.

La Sífilis Secundaria: se produce unas semanas después de que la llaga desaparece. Durante esta etapa, puede aparecer una erupción en el cuerpo, las manos o los pies. El sarpullido es contagioso y puede parecerse a otras erupciones o incluso crecimientos como verrugas. Otros síntomas de la sífilis secundaria incluyen fiebre leve, dolor de garganta o la pérdida del pelo por montones.

La Sífilis Latente: Se desarrolla un año después de la infección. Durante esta etapa, los síntomas han desaparecido y por lo general la persona que está infectada ya no puede infectar a sus parejas sexuales. Sin embargo, la enfermedad permanece en el cuerpo y puede causar graves daños años más tarde.

Los daños causados por la sífilis se hacen evidentes en su etapa final, conocida como la sífilis terciaria o tardía. Esta etapa generalmente se produce 10 años o más después de la infección sin tratamiento.

Las complicaciones durante la sífilis tardía incluyen:

- Daño a la piel, huesos u otros órganos internos
- Problemas neuronales como la hinchazón del cerebro, ceguera, convulsiones e inestabilidad mental
- Daño a los vasos sanguíneos y el corazón

Estas complicaciones pueden ser mortales. Un bebé de una madre con sífilis puede nacer muerto o tener defectos de nacimiento.

¿Cómo se trata la sífilis?

La sífilis se puede tratar con antibióticos administrados por inyección. Antes de ser tratado de sífilis, debe evitar poner sus parejas sexuales en riesgo y debe protegerse de entrar en contacto con otras infecciones de transmisión sexual.

¿Cómo puedo reducir el riesgo de contraer sífilis?

Los condones de látex, poliuretano y los condones femeninos ofrecen cierta protección, pero no puede cubrir todas las áreas infecciosas. Las mujeres embarazadas deben obtener cuidado prenatal temprano y deben hacerse la prueba de la sífilis durante el primer trimestre. Las mujeres embarazadas pueden prevenir el daño a su bebé si la sífilis se detecta y se trata temprano.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

- Para una lista de lugares de prueba del VIH / ETS más actualizada visite www.hivla.org
- Visite www.hivla.org. Llame a la línea directa de las ETS del Departamento de Salud Pública de Los Angeles al (800) 758-0880
- Llame a la Clínica de ETS, Valle del Antílope (661) 723-4526 y el Centro / Unidad Móvil de pruebas (213) 744-5958 del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles

Si los servicios de pruebas de VIH / ETS y el tratamiento que recibe no son apropiados, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia de OAPP @ (800) 260-8787.